



PERSBERICHT

27/10/2021

UPC Duffel ondersteunt de internationale oproep voor gelijke toegang tot vaccinaties voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

(bericht onder embargo tot 27/10/2021; 00:01)

Oproep tot gelijke toegang tot vaccinaties

De International Equally Well Alliance richt zich met deze internationale oproep op de ongelijkheden in gezondheidsstelsels over de hele wereld. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een psychische aandoening twee keer zoveel kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen, langetermijneffecten te ervaren of te overlijden aan COVID-19.

Bovendien hebben ze vier keer meer kans andere vermijdbare ziekten zoals influenza of tuberculose op te lopen en hieraan te overlijden. Deze cijfers komen uit een rapport in de Lancet Psychiatry en in Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Equally Well is een vereniging van individuen en organisaties die samenwerken om de lichamelijke gezondheid van mensen met psychische en verslavingsproblemen te verbeteren. Deze internationale actie wordt mede geleid door Equally Well Australia, Equally Well UK en Equally Well Nieuw-Zeeland met steun van alliantieleden in 12 landen in Europa, Azië en de Verenigde Staten, waaronder ook België. Het doel van deze campagne is ook om het netwerk van Call to Action supporters uit te breiden.

Woordvoerder voor Equally Well Australia professor Russell Roberts (Charles Sturt University, Australië) stelt dat gelijke toegang tot vaccins een fundamenteel mensenrecht is. "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadde aan dat alle landen voorzorgsmaatregelen treffen om kwetsbare doelgroepen inzake de COVID-19-vaccinatie voorrang te geven. We zagen echter dat in vele landen de personen met een psychische ziekte of verslavingsproblematiek geen of laattijdige hulp kregen om een geïnformeerde keuze te maken rond het vaccinatieprogramma."

Dr. Livia De Picker, psychiater UPC Duffel en postdoctoraal onderzoeker SINAPS vult aan: "*In het voorjaar van 2021 hebben wij met collega's uit heel Europa campagne gevoerd om patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen voorrang te geven bij de vaccinatie tegen COVID-19. Nu er wordt gesproken over een derde prik voor de meest kwetsbare patiënten, is het van cruciaal belang om dit opnieuw onder de aandacht te brengen, want helaas zien we dat deze patiënten vaak nog met allerlei belemmeringen geconfronteerd worden waardoor zij uiteindelijk minder beschermd zijn. In tegenstelling tot wat men vaak gelooft, is de vaccinatiebereidheid bij mensen met een psychische aandoening hetzelfde als bij de rest van de bevolking. Met de juiste informatie, meer aandacht en minder stigma, kunnen we levens redden.*"

Campagnewebsite

Personen en organisaties die deze internationale oproep willen ondersteunen kunnen de volledige verklaring (in het Engels) lezen en ondertekenen op de campagnewebsite:

<https://www.equallywell.org.au/declaration/>

Achtergrondinformatie

- Mensen met een psychische aandoening sterven gemiddeld 20 jaar eerder dan de rest van de bevolking.
- Als gevolg van discriminatie, stigmatisering en het onvoldoende zorg voor fysieke gezondheidsproblemen, hebben mensen met een psychische aandoening twee keer zoveel kans om vroegtijdig te overlijden.
- Een voorbeeld: terwijl borstkanker even vaak voorkomt bij vrouwen met een psychische aandoening hebben ze zes keer meer kans om hieraan te overlijden. Mannen met een psychische aandoening hebben vijf keer meer kans om te overlijden aan prostaatkanker.



UPC Duffel
geestelijke gezondheidszorg
emmaüs



EQUALLYWELL
Quality of Life - Equality in Life

- Meer dan tien keer meer mensen met een psychische aandoening sterven vroeg door lichamelijke gezondheidsproblemen dan door zelfmoord.
- Veel van de oorzaken van vroegtijdig overlijden zijn volledig te voorkomen door vroegtijdige screening en preventieve gezondheidsmaatregelen zoals vaccinatie.

Referenties

Sara, G., Chen, W., Large, M., Ramanuj, P., Curtis, J., McMillan, F., Mulder, C., Currow, D. & Burgess, P. 2021. Potentially preventable hospitalisations for physical health conditions in community mental health service users: a population-wide linkage study. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 30, e22

Vai B, Mazza MG, Delli Colli C, Foiselle M, Allen B, Benedetti F, et al. Mental Disorders and Risk of Covid-19 Related Mortality, Hospitalization and Intensive Care Unit Admission: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Lancet Psychiatry*. 2021;8:797-812

World Health Organization. WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination, 14 September 2020. World Health Organization; 2020.

Meer info

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel

Communicatiedienst, upcd.communicatie@emmaus.be, 015 30 49 44 of 0474 48 19 57

Dr. Livia De Picker

livia.depicker@uantwerpen.be; 015 30 40 30